


様  
ID:

5-FU+I-LV(sLV5FU2)+Bev

癌種：大腸癌

身長  cm 体重  kg (≒ 0.00 m<sup>2</sup>)



% dose

			実投与量	投与速度
①	グラニセトロンパック <sup>®</sup> +デキサート	100 mL 6.6 mg	100 mL 6.6 mg	30min div
②	アバスチン + 生食	( 5 mg/kg ) 100 mL	mg 100 mL	1回目 90min div 2回目 60min div 3回目以降 30min div
③	レボホリナート +5%糖液	( 200 mg/m <sup>2</sup> ) 250 mL	mg 250 mL	2hr div
④	5-FU + 生食	( 400 mg/m <sup>2</sup> ) 100 mL	mg 100 mL	全開 div ③終了後
⑤	5-FU + 生食	( 2400 mg/m <sup>2</sup> ) mL	mg mL	46hr div (インフューザポンプ) ④終了後
⑥	5%糖液	100 mL	100 mL	プライミング・抜針用

提出診療科	消化器外科
対象	切除不能進行・再発大腸がん stage IV
提出年月日	2008. 08.01.
上記レジメンの根拠となる文献等	Hurwitz HI,et,al : J Clin Oncol 23:3502-3508,2005 Saltz LB,et,al : N Engl J Med 343 : 905-914,2000 ※但し、RPMI レジメンの5FU+LV でのエビデンスであり sLV5FU2 での前向き試験ではない。

改訂：2010.05.26