

様  
ID:

GEM + CDDP (GC 療法) short hydration 版 癌種：胆道がん

身長  cm 体重  kg (≒ 0.00 m<sup>2</sup>)



		実投与量	投与速度
主管	①	ラクテック 500 mL	あわせて約 2時間 30分 程度
		+MgSO <sub>4</sub> 1mEq/mL 4 mL	
	②	ラクテック 500 mL	
		+MgSO <sub>4</sub> 1mEq/mL 4 mL	
側管	①	アロキシ 0.75 mg	30min div
		+デキサート 6.6 mg	
		+生食 100 mL	
	⑤	シスプラチン ( 25 mg/m <sup>2</sup> )	60min div
		+生食 250 mL	
	⑥	ジエムザール ( 1000 mg/m <sup>2</sup> )	30min div
		+生食 100 mL	
⑦	20% マンニトール 200 mL	30min div	

+ day 1: イメンド<sup>®</sup>125mg、day 2,3: イメンド<sup>®</sup>80mg

提出診療科	消化器外科
対象	切除不能進行・再発胆道がん stage IV
提出年月日	2015.07.22
上記レジメンの根拠となる文献等	T Okusaka, et al. B.J. Cancer. (2010) 103,469-474 J Valle, et al. J. Clin. Oncol. 27 :15s, 2009(suppl; abstr 4503) J Valle, et al. N Engl J Med 2010;362:1273-81 JCOG1113試験 CG vs GS 第Ⅲ相比較試験実施計画書 ver1.1 Morizane C, et al: J.Clin.Oncol. 4_suppl:205, 2018