


様
ID:

FOLFIRI + Afibercept(2nd line) 癌種：大腸癌

身長 cm 体重 kg (≒ 0.00 m²)



| | 実投与量 | 投与速度 |
|------------------------------|--|---|
| ① グラニセトンバッグ +デキサート | 100 mL 9.9 mg | 30min div |
| ② サルトラップ [®] +生食 | (4 mg/kg) 100 mL | 60min div |
| ③ レボホリナート +5%糖液 | (200 mg/m ²) 250 mL | 2hr div } ②終了後 同時 start |
| ④ イリリテカン「タイホウ」 +5%糖液 | (150 mg/m ²) 250 mL | |
| ⑤ 5-FU +生食 | (400 mg/m ²) 100 mL | 全開 div ③④終了後 |
| ⑥ 5-FU +生食 5%糖液 | (2400 mg/m ²) mL 100 mL | 46hr div (インフューザーポン プ) ⑤終了後 プライミング・抜針用 |

※イメンド使用時はデキサートの投与量は 4.95mg

| | |
|-------------------------|--|
| 提出診療科 | 消化器外科 |
| 対象 | 切除不能進行・再発大腸がん stage IV 2nd line |
| 提出年月日 | 2019.7.22 |
| 上記レジメンの 根拠となる文 献等 | Eric Van Cutsem., et al : J Clin Oncol.30(28):3499-3506,2012:689 ※登録レジメンはCPT-11の日本での承認用量である。 Sato T, et al.: J Clin Oncol. 35, 2017 (suppl 4S; abstract 707) |