

様
ID:

様


FOLFIRI+Bev

癌種：大腸癌

身長 cm 体重 kg (≒ 0.00 m²)

投与レジメン

2週毎に



% dose

	実投与量	投与速度
① グラニセトロンバッグ +デキサート	100 mL 9.9 mg	30min div
② アバスチン +生食	(5 mg/kg) 100 mL	1回目 90min div 2回目 60min div 3回目以降 30min div
③ レボホリナート +5%糖液	(200 mg/m ²) 250 mL	2hr div
④ イリリテカン「タイホウ」 +5%糖液	(150 mg/m ²) 250 mL	2hr div
⑤ 5-FU +生食	(400 mg/m ²) 100 mL	全開 div
⑥ 5-FU +生食	(2400 mg/m ²) mL	46hr div (インフューザーポン プ)
⑦ 5%糖液	100 mL	ブライミング・抜針用

※イメド使用時はデキサートの投与量は 4.95mg

提出診療科	消化器外科
対象	切除不能進行・再発大腸がん stage IV
提出年月日	2010.05.24
上記レジメンの根拠となる文献等	Fuchs CS, Marshall J, Barrueco J, et al : J Clin Oncol. 26:689-690, 2008 (BICC-C Study) ※登録レジメンはCPT-11の日本での承認用量である。 Yamazaki K, et al.: Ann Oncol. 27(8): 1539-1546, 2016