

ID: [REDACTED]  
様


FOLFIRI+Pmab

癌種：大腸癌

身長 [REDACTED] cm  
体重 [REDACTED] kg

( $\equiv$ )

0.00 m<sup>2</sup>



[REDACTED] % dose

	実投与量	投与速度	
① グラニセトロンバッグ	3.00 mg/100mL	3 mg 30min div	
+デキサート	9.9 mg	9.9 mg	
② ベケチビックス ( 6 mg/kg )	mg	1hr div	
+生食 total	100 mL	mL	
③ レボホリナート ( 200 mg/m <sup>2</sup> )	mg	2hr div	
+5%糖液	250 mL	250 mL	
④ イリノテカン「タイホウ」 ( 150 mg/m <sup>2</sup> )	mg	2hr div	②終了後 同時 start
+5%糖液	250 mL	250 mL	
⑤ 5-FU ( 400 mg/m <sup>2</sup> )	mg	全開 div	③④終了後
+生食	100 mL	100 mL	
⑥ 5-FU ( 2400 mg/m <sup>2</sup> )	mg	46hr div (インフューザーポン ブ)	⑤終了後
+生食	100 mL	100 mL	プライミング・抜針用
生食	100 mL		

\*イメント使用時はデキサートの投与量は 4.95mg

提出診療科	消化器外科
対象	切除不能進行・再発大腸がん stage IV
提出年月日	2011.01.19
上記レジメンの根拠となる文献等	Marc Peeters,et al.J Clin Oncol.28(31):4706-4713,2010