

様  
ID: [redacted]


FOLFIRI

癌種：大腸癌

身長 [redacted] cm 体重 [redacted] kg (≡ 0.00 m<sup>2</sup>)

投与レジメン

2週毎に



[redacted] % dose

	実投与量		投与速度	
①	グラニセトロンバッグ +デキサート	100 mL 9.9 mg	100 mL 9.9 mg	30min div
②	レボホリナート +5%糖液	( 200 mg/m <sup>2</sup> ) 250 mL	mg 250 mL	2hr div
③	イリノテカン「タイホウ」 +5%糖液	( 150 mg/m <sup>2</sup> ) 250 mL	mg 250 mL	2hr div
④	5-FU +生食	( 400 mg/m <sup>2</sup> ) 100 mL	mg 100 mL	全開 div
⑤	5-FU +生食	( 2400 mg/m <sup>2</sup> ) mL	mg mL	46hr div (インフューザーポン プ)
⑥	5%糖液	100 mL	100 mL	プライミング・抜針用

①終了後  
同時 start

②③終了後

④終了後

提出診療科	消化器外科
対象	切除不能進行・再発大腸がん stage IV
提出年月日	2009. 03.02.
上記レジメンの 根拠となる文 献等	Tournigand C, et al. J Clin Oncol. 22(2):229, 2004 Douillard JY, et al. Lancet 355(9209):1041, 2000 ※登録レジメンはCPT-11の日本での承認用量である。(原著レジメンでは180mg/m <sup>2</sup> )