


様 FOLFIRINOX (原法・インフューザーポンプ使用) 癌種：膵臓がん (切除不能進行・再発)

ID:

身長 cm 体重 kg (≒ 0.00 m²)



			実投与量	投与速度	
①	アロキシシ0.75mg + テキサト3.3mg + 生食	1 V 3 A 100 mL	1 V 3 A 100 mL	30 min div	
②	エルプラット (85 mg/m ²) + 5%糖液	250 mL	250 mL	2 hr div	
③	レボホリナート (200 mg/m ²) + 5%糖液	250 mL	250 mL	2 hr div	③の開始30分後に④を平行して投与開始
④	イリリテカン「タイホウ」 (180 mg/m ²) + 5%糖液	250 mL	250 mL	90 min div	
⑤	5-FU (400 mg/m ²) + 生食	100 mL	100 mL	全開 div	③④終了後
⑥	5-FU (2400 mg/m ²) + 生食	mL	mL	46hr div (インフューザーポンプ)	⑤終了後

本療法は**高度催吐リスクレジメン**です。
 悪心・嘔吐を予防するため、
 左記の注射薬に**加えて**、以下をご処方ください。
 day 1: アプレピタント 125mg 1C
 day 2、3: アプレピタント 80mg 1C
 day 2、3、4、(5): デカドロン錠 8mg

提出診療科	消化器外科
対象	切除不能進行・再発膵臓がん stage IV
提出年月日	2018/9/15
上記レジメンの根拠となる文献等	Conroy T, et al : N Engl J Med 364 : 1817-1825, 2011 Okusaka T, et al : Cancer Sci 105 : 1321-1326, 2014