


様
ID:

FOLFIRINOX (原法・末梢点滴) 癌種: 膵臓がん (切除不能進行・再発)

身長 cm 体重 kg (≒ 0.00 m²)



% dose

	実投与量	投与速度	
① アロキシシ0.75mg +デキセプロフェン3.3mg +生食 100 mL	1 V 3 A 100 mL	30 min div	
② エルプラット (85 mg/m ²) +5%糖液 250 mL	mg 250 mL	2 hr div	
③ レボホリナート (200 mg/m ²) +5%糖液 250 mL	mg 250 mL	2 hr div	③の開始30分後に④を平行して投与開始
④ イリリネカン「タイホウ」 (180 mg/m ²) +5%糖液 250 mL	mg 250 mL	90 min div	
⑤ 5-FU (400 mg/m ²) +生食 100 mL	mg 100 mL	全開 div	③④終了後
⑥ 5-FU (2400 mg/m ²) +生食 1000 mL	mg 1000 mL	23 hr div	⑤終了後
⑧ 生食 100 mL	100 mL	血管外漏出予防のためのライン洗浄用	

本療法は**高度催吐リスクレジメン**です。
悪心・嘔吐を予防するため、
左記の注射薬に**加えて**、以下をご処方ください。
day 1: アプレピタント 125mg 1C
day 2、3: アプレピタント 80mg 1C
day 2、3、4、(5): デカドロン錠 8mg

提出診療科	消化器外科
対象	切除不能進行・再発膵臓がん stage IV
提出年月日	2018/9/15
上記レジメンの根拠となる文献等	Conroy T, et al : N Engl J Med 364 : 1817-1825, 2011 Okusaka T, et al : Cancer Sci 105 : 1321-1326, 2014