


様
ID:
身長 cm 体重 kg

FTD/TPI + Bev 療法

癌種：大腸癌

(≒ 0.00 m²)

基本レジメン



Bev	5mg/kg (day 1, 15) d.i.v.
FTD/TPI	1.07 m ² 未満……………35 mg/回 (70 mg / 日)
	1.07 m ² 以上1.23 m ² 未満・40 mg/回 (80 mg / 日)
	1.23 m ² 以上1.38 m ² 未満・45 mg/回 (90 mg / 日)
	1.38 m ² 以上1.53 m ² 未満・50 mg/回 (100 mg / 日)
	1.53 m ² 以上1.69 m ² 未満・55 mg/回 (110 mg / 日)
	1.69 m ² 以上1.84 m ² 未満・60 mg/回 (120 mg / 日)
	1.84 m ² 以上1.99 m ² 未満・65 mg/回 (130 mg / 日)
	1.99 m ² 以上2.15 m ² 未満・70 mg/回 (140 mg / 日)
	2.15 m ² 以上……………75 mg/回 (150 mg / 日)
	1日2回(朝・夕)食後

投与レジメン % dose

		実投与量	投与速度	day 1	…	day 6	…	day 8	…	day 13	…	day 15	…	…day28
内服	FTD/TPI (70-150 mg/body/日)	mg	p.o.	夕～	●	●	●	夕～	●	●	●			休薬
注射	① アパスチン 5 mg/kg	mg	90min div★	●			休薬				休薬	●		休薬
	+生食 100 mL	100 mL		●									●	
	5%ブドウ糖液 100 mL プライミング・抜針用	100 mL		●								●		

★：初回投与時は90分、初回の忍容性が良好であれば、2回目の投与は60分間、さらに2回目の投与においても忍容性が良好であればそれ以降の投与は30分間投与とすることができる。

対象	切除不能転移・再発大腸がん
提出診療科	消化器外科
上記レジメンの根拠となる文献等	Kuboki Y,et.al : Lancet Oncol 18 : 1172-1181,2017<C-TASK FORCE >