


様
ID:
身長 cm 体重 kg

G-SOX 療法

癌種：胃がん

(≡ 0.00 m²) ※藤本式で算出

基本レジメン



L-OHP 100~130mg/m² or 100mg/m² (day1) d.i.v.

**S-1 1.25m²未満……………80mg/day
1.25m²以上1.5m²未満…100mg/day
1.5m²以上……………120mg/day**

1日2回(朝・夕)食後 2weeks p.o.

% dose

		実投与量	投与速度	day 1	day2	…	day15	…	day22
内服	S-1 (80 mg/m ² , 最大120mg/body) ※	mg	p.o.	夕~	●	●	●	朝	休 ~朝
①	グラニセロンハッグ 3.00 mg/100mL	3 mg	30min div	●	/				
	+デキサート 6.6 mg	6.6 mg		●					
③	エルプラット (130 mg/m ²)	mg	120min div	●					
	+5%糖液 250 mL	mL							
④	5%糖液 100 mL プライミング・後流し用	100 mL	30min div	●					

エルプラットの投与量(mg/m²)は pull down ボタンで130、100mg/m² から選択できます。

提出診療科	消化器外科
対象	1) 切除不能進行・再発胃癌 2) 術後補助化学療法 6ヶ月間(L-OHP 100mg/m ² 2サイクル目以降に追加):エビデンスレベルB
上記レジメンの根拠となる文献等	1) 切除不能進行・再発胃がん Y.Yamada,et al:Phase III study comparing oxaliplatin plus S-1 with cisplatin plus S-1 in chemotherapy-naïve patients with advanced gastric cancer.: Ann Oncol. 26(1): 141-148, 2015 David Cunningham; Capecitabine and Oxaliplatin for Advanced Esophagogastric Cancer. N Engl J Med 2008;358:36-46 2) 術後補助化学療法 stage III Shitara K,Chin K,Yoshikawa T,et al :Gastric Cancer (2017) 20:175-181