


様
ID:
身長 [] cm 体重 [] kg

G-XELOX 療法

癌種：胃がん

(≡) 0.00 m²) ※ Du Bois 式で算出

基本レジメン



L-OHP	100~130mg/m ² or 100mg/m ² (day1)	d.i.v.
cape	1.36m ² 未満.....1200mg/回	1日2回(朝・夕)食後 2weeks p.o. (day 1 夕-15 朝)
	1.36m ² 以上1.66m ² 未満・1500mg/回	
	1.66m ² 以上1.96m ² 未満・1800mg/回	
	1.96m ² 以上.....2100mg/回	

[] % dose

		実投与量	投与速度	day 1	day2	...	day15
内服	Cape (1000 mg/m ² , 最大4200mg/body) ※	mg	p.o.	夕~	●	●	●朝
①	グラニセロンハック [®] 3.00 mg/100mL	3 mg	30min div	●	/	/	/
	+デキサート 6.6 mg	6.6 mg		●			
②	エルプラット (130 mg/m ²)	mg	120min div	●			
	+5%糖液 250 mL	mL					
③	5%糖液 100 mL プライミング・後流し用	100 mL		●			

エルプラットの投与量(mg/m²)は pull down ボタンで130、100mg/m² から選択できます。

提出診療科	消化器外科
対象	1) 切除不能進行・再発胃癌 2) 術後補助化学療法(6ヶ月間投与)
上記レジメンの根拠となる文献等	1) Cunningham D, et al.: N Engl J Med. 358(1): 36-46, 2008 (REAL-2) Kim GM, et al.: Eur J Cancer. 48(4): 518-526, 2012 (NCT00985556) 2) Noh SH, et al.: Lancet Oncol. 15(12): 1389-1396, 2014 (CLASSIC試験) Fuse N, et al.: Gastric Cancer. 20(2): 332-340, 2017 (J-CLASSIC試験)