

様


GS 療法

癌種：切除不能進行膵がん

ID:

身長  cm 体重  kg (≐ 0.00 m<sup>2</sup>)

## 基本レジメン

**GEM 1000mg/m<sup>2</sup> d.i.v. (Day 1,8)**

**S-1** 1.25m<sup>2</sup>未満……………60mg/day (朝40mg, 夕20mg)  
 1.25m<sup>2</sup>以上1.5m<sup>2</sup>未満……………80mg/day  
 1.5m<sup>2</sup>以上……………100mg/day  
 1日2回(朝・夕)食後 2weeks p.o.

 % dose

※前コースで安全性に問題が無い場合はS1のみを1段階増量することができる。  
 (60mg → 80mg、80mg → 100mg、100mg → 120mg)  
 但し、コースの途中での増量は行わない。

		実投与量	投与速度	day 1	…	day 8	…	day 14	day 15	…	day 21
内服	S-1 (60 mg/m <sup>2</sup> 、最大120mg/body)	mg	p.o.	●	●	●	●	●	休薬		
点滴	① グラネセロンバッグ 100 mL	100 mL	30min div	●		●					
	② ジェムザール (1000 mg/m <sup>2</sup> ) 生食 100 mL	100 mL	30min div	●		●					
	③ 生食 100 mL	100 mL	プライミング、抜針用								

対象	切除不能進行膵がん
提出診療科	消化器外科
提出年月日	2019/01/09改訂
上記レジメンの根拠となる文献等	Hideki Ueno et al, JCOncol 31, no. 13 (May 2013) 1640-1648.