

様

ID:

nab-PAC + GEM 療法

癌種：膵癌

身長

cm


体重

kg

(≒

0.00 m<sup>2</sup>)

※Mosteller の式で算出



	実投与量	投与速度
① アロキシ 0.75 mg + デキサート 6.6 mg	0.75 mg 6.6 mg	30min div
+ 生食 100 mL ② アブラキサン (選択 mg/m <sup>2</sup> ) + 生食 適宜	100 mL mg mL	30min div
③ ジェムサル (1000 mg/m <sup>2</sup> ) + 生食 100 mL	mg 100 mL	30min div
④ 生食 100 mL	100 mL	プライミング、抜針用

アブラキサンの投与量 (mg/m<sup>2</sup>) は pull down で減量段階ごとに選択できます

75 mg/m<sup>2</sup> → 100 mg/m<sup>2</sup> → 125 mg/m<sup>2</sup>

提出診療科 対象	消化器外科 治癒切除不能な膵癌 (主要臓器機能が保たれている)
提出年月日	2016.5.16
上記レジメンの 根拠となる文 献等	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆Hideki Ueno, et al : Phase I / II study of nab-paclitaxel plus gemcitabine for chemotherapy -native Japanese patients with metastatic pancreatic cancer. 2016 Mar;77(3):595-603. doi: 10.1007/s00280-016-2972-3. Epub 2016 Feb 3.</li> <li>◆Von Hoff DD, et al : Increased survival in pancreatic cancer with nab-paclitaxel plus gemcitabine. N Engl J Med. 2013 Oct 31;369(18):1691-703. doi: 10.1056/NEJMoa1304369. Epub 2013 Oct 16.</li> <li>◆アブラキサン適正使用ガイド[膵癌] 大鵬薬品工業株式会社 2014.12作成</li> </ul>