


様
ID:
身長 cm 体重 kg

IRIS (S1+CPT-11) 療法 2投2休 癌種：大腸癌

(≐ 0.00 m²)

基本レジメン



CPT-11 125mg/m² (day1、15) d.i.v.
S-1 1.25m²未満……………80mg/day
1.25m²以上1.5m²未満…100mg/day
1.5m²以上……………120mg/day
1日2回(朝・夕)食後 2weeks p.o.

投与レジメン % dose

		実投与量	投与速度	day 1	…	day 15	…	day 28
内服	S-1 (80 mg/m ² 、最大120mg/body)	mg	p.o.	夕～	●	●	●	～朝
注射	① テキサート 6.6 mg + グラネセロンバッグ 100 mL	6.6 mg 100 mL	30min div	●		●		休薬
	② イリリネカン塩酸塩 (125 mg/m ²) 5%ブドウ糖液 250 mL	mg 250 mL	90 min div	●		●		
	③ 5%ブドウ糖液 100 mL プライミング・抜針用			●				

対象	切除不能転移・再発大腸がん PS 0～1
提出診療科	消化器外科
提出年月日	
上記レジメンの根拠となる文献等	・2nd line : FIRIS study : K.Muro et.al:The Lancet Oncology,Vol 11 Issue9,853-860,2010 ・1st line : HGCSG0302試験 : Komatsu Y, et al.: Oncology 80(1-2): 70-75, 2011

S-1減量表

初回投与量	減量
80mg/day	休薬
100mg/day	80mg/day→休薬
120mg/day	100mg/day→80mg/day→休薬