

様  
ID:


IRIS (S1+CPT-11) + Bev 療法 2投2休

癌種：大腸癌

身長  cm 体重  kg

(≒ 0.00 m<sup>2</sup>)

基本レジメン



投与レジメン  % dose

		実投与量	投与速度	day 1	…	day 15	…	day 28
内服	S-1 ( 80 mg/m <sup>2</sup> 、最大120mg/body )	※	mg	p.o.	夕～	●	●	～朝
注射	① テキサート 6.6 mg + グラネセロンバッグ 100 mL	6.6 mg 100 mL	30min div	●				●
	② アパステン 5 mg/kg + 生食 100 mL	mg 100 mL	90min div★	●				
	③ イリリネカン塩酸塩 ( 100 mg/m <sup>2</sup> ) 5%ブドウ糖液 250 mL	mg 250 mL	90 min div	●				●
	5%ブドウ糖液 100 mL プライミング・抜針用	100 mL		●				

CPT-11はプルダウンで100mgもしくは125mgを選べます

★：初回投与時は90分、初回の忍容性が良好であれば、2回目の投与は60分間、さらに2回目の投与においても忍容性が良好であればそれ以降の投与は30分間投与とすることができる。

対象	切除不能転移・再発大腸がん PS 0～1
提出診療科	消化器外科
上記レジメンの根拠となる文献等	Muro K, et al.: Lancet Oncol. 11(9): 853-860, 2010 Komatsu Y, et al. Acta Oncol. 51(7): 867-872, 2012

S-1減量表

初回投与量	減量
80mg/day	休薬
100mg/day	80mg/day→休薬
120mg/day	100mg/day→80mg/day→休薬