

様  
ID: [redacted]


S1+DTX 療法

癌種：切除不能進行・再発 胃がん

身長 [redacted] cm 体重 [redacted] kg

(≡ 0.00 m<sup>2</sup>)

基本レジメン



**DOC 40mg/m<sup>2</sup> d.i.v. (Day1)**

**S-1 1.25m<sup>2</sup>未満……………80mg/day**  
**1.25m<sup>2</sup>以上1.5m<sup>2</sup>未満…100mg/day**  
**1.5m<sup>2</sup>以上……………120mg/day**

1日2回(朝・夕)食後 2weeks p.o.

投与レジメン [redacted] % dose

		実投与量	投与速度	day 1	…	day 14	day 15	…	day 21
内服	S-1 ( 80 mg/m <sup>2</sup> 、最大120mg/body)	mg	p.o.	●	●	●	休薬		
点滴	① テキサート 6.6 mg	6.6 mg	30min div	●					
	+ グラニセトロンバッグ 100 mL	100 mL							
	② タキソテール ( 40 mg/m <sup>2</sup> )	mg	1 hr div	●					
5%ブドウ糖液 250 mL	250 mL								
	③ 5%ブドウ糖液 100 mL プライミング・後流し用	100 mL		●					

対象	切除不能転移・再発胃がん PS 0~2
提出診療科	消化器外科
上記レジメンの根拠となる文献等	Koizumi W, Kim YH, Fujii M, et al: J Cancer Res Clin Oncol 2014;140:319-28.<START trial>

S-1減量表

初回投与量	減量
80mg/day	休薬
100mg/day	80mg/day→休薬
120mg/day	100mg/day→80mg/day→休薬