

様 ID:

S1+DTX 療法

癌種：胃がん（術後補助化学療法）

身長 cm 体重 kg


(≡ 0.00 m²)

基本レジメン

DOC 40mg/m² d.i.v. (Day1)

**S-1 1.25m²未満……………80mg/day
1.25m²以上1.5m²未満…100mg/day
1.5m²以上……………120mg/day**

1日2回（朝・夕）食後 2weeks p.o.



術後 1年まで
継続

投与レジメン % dose

		実投与量	投与速度	day 1	…	day 14	day 15	…	day 21
内服	S-1 (80 mg/m ² , 最大120mg/body)	mg	p.o.	●	●	●	休薬		
点滴	① テキサート 6.6 mg + グラニセトロンバッグ 100 mL	6.6 mg 100 mL	30min div	●					
	② タキソテル (40 mg/m ²) 5%ブドウ糖液 250 mL	mg 250 mL	1 hr div	●					
	③ 5%ブドウ糖液 50 mL プライミング・後流し用	50 mL		●					

対象	stage IIIの根治切除胃がん(術後補助化学療法)
提出診療科	消化器外科
提出年月日	2019/8/30
上記レジメンの根拠となる文献等	oshida K, et al.: J Clin Oncol. 37(15): 1296-1304, 2019 <JACCRO GC-07: START-2>

S-1減量表

初回投与量	減量
80mg/day	休薬
100mg/day	80mg/day → 休薬
120mg/day	100mg/day → 80mg/day → 休薬