


様  
ID:  
身長 cm 体重 kg

SIRB(S1+CPT-11+Bev)療法

癌種：大腸癌

(≒ 0.00 m<sup>2</sup>)

基本レジメン



**Bev 7.5mg/kg (day 1) d.i.v.**  
**CPT-11 150mg/m<sup>2</sup> (day 1) d.i.v.**  
**S-1** 1.25m<sup>2</sup>未満……………80mg/day  
 1.25m<sup>2</sup>以上1.5m<sup>2</sup>未満…100mg/day  
 1.5m<sup>2</sup>以上……………120mg/day  
 1日2回(朝・夕)食後 2weeks p.o.

投与レジメン % dose

		実投与量	投与速度	day 1	…	day 15	…	day 21
内服	S-1 ( 80 mg/m <sup>2</sup> 、最大120mg/body)	※	mg	p.o.	夕	●	朝	
注射	① テキサート 6.6 mg + グラネセトロンバッグ 100 mL		6.6 mg 100 mL	30min div	●			休薬
	② アバスチン 7.5 mg/kg + 生食 100 mL		mg 100 mL	90min div*	●			
	③ イリリテカン塩酸塩 ( 150 mg/m <sup>2</sup> ) 5%ブドウ糖液 250 mL		mg 250 mL	90 min div	●			
	④ 生食 100 mL プライミング・抜針用		100 mL		●			

★：初回投与時は90分、初回の忍容性が良好であれば、2回目の投与は60分間、さらに2回目の投与においても忍容性が良好であればそれ以降の投与は30分間投与とすることができる。

対象	切除不能転移・再発大腸がん PS 0~1
提出診療科	消化器外科
上記レジメンの根拠となる文献等	<ul style="list-style-type: none"> <li>Phase II trial of combination therapy with S-1, irinotecan, and bevacizumab (SIRB) in patients with metastatic colorectal cancer : T Yamaguchi et.al: ASCO GI abstract No.456</li> <li>TRICOLORE試験 : Yamada Y, et al.: Ann Oncol. 29(3): 624-631, 2018</li> </ul>

S-1減量表

初回投与量	減量
80mg/day	休薬
100mg/day	80mg/day→休薬
120mg/day	100mg/day→80mg/day→休薬