

様  
ID:


SIR (S1+CPT-11) 療法 2投1休

癌種：大腸癌

身長 cm 体重 kg

(≒ 0.00 m<sup>2</sup>)

基本レジメン



**CPT-11 150mg/m<sup>2</sup> ( day1) d.i.v.**

**S-1 1.25m<sup>2</sup>未満……………80mg/day**  
**1.25m<sup>2</sup>以上1.5m<sup>2</sup>未満…100mg/day**  
**1.5m<sup>2</sup>以上……………120mg/day**

1日2回(朝・夕)食後 2weeks p.o.

投与レジメン % dose

内服		実投与量	投与速度	day 1	…	day 15	…	day 21
	S-1 ( 80 mg/m <sup>2</sup> 、最大120mg/body)	mg	p.o.	夕~	●	●	●	~朝
注射	① テキサート 6.6 mg + グラニセトロンバッグ 100 mL	6.6 mg 100 mL	30min div	●				休薬
	② イリノテカン塩酸塩 ( 150 mg/m <sup>2</sup> ) 5%ブドウ糖液 250 mL	mg 250 mL	90 min div	●				
	③ 5%ブドウ糖液 100 mL プライミング・抜針用	100 mL		●				

対象	切除不能転移・再発大腸がん PS ≤2
提出診療科	消化器外科
上記レジメンの根拠となる文献等	Phase II study of combination therapy with S-1 and irinotecan in patients with advanced colorectal cancer :A. Goto et.al :Ann Oncol 17:968-973,2006

S-1減量表

初回投与量	減量
80mg/day	休薬
100mg/day	80mg/day→休薬
120mg/day	100mg/day→80mg/day→休薬