

様
ID:


SOX(S1+L-OHP)+Bev 療法

癌種：大腸癌

身長 cm 体重 kg

(≒ 0.00 m²)

基本レジメン



Bev 7.5mg/kg (day1) d.i.v.

L-OHP 130mg/m² (day1) d.i.v.

S-1 1.25m²未満……………80mg/day
1.25m²以上1.5m²未満…100mg/day
1.5m²以上……………120mg/day

1日2回(朝・夕)食後 2weeks p.o.

投与レジメン % dose

		実投与量	投与速度	day 1	…	day 15	…	day 21
内服	S-1 (80 mg/m ² 、最大120mg/body)	mg	p.o.	夕●	●	朝●		
注射	① テキサート 6.6 mg +グラニセトロンバッグ 100 mL	6.6 mg 100 mL	30min div	●				休薬
	② アハスチン 7.5 mg/kg +生食 100 mL	mg 100 mL	90min div★	●				
	③ エルプラット (130 mg/m ²) 5%ブドウ糖液 250 mL	mg 250 mL	2 hr div	●				
	5% 糖液 100 mL プライミング・抜針用	100 mL		●				

★：初回投与時は90分、初回の忍容性が良好であれば、2回目の投与は60分間、さらに2回目の投与においても忍容性が良好であればそれ以降の投与は30分間投与とすることができます

対象	切除不能転移・再発大腸がん PS 0～1
提出診療科	消化器外科
上記レジメンの根拠となる文献等	Yamada Y, et al : Leucovorin, fluorouracil, and oxaliplatin plus bevacizumab S-1 and oxaliplatin plus bevacizumab in patients with metastatic colorectal cancer (SOFT) : an open-label, non-inferiority, randomised phase 3 trial. Lancet Oncol 2013;14:1278-86.

S-1減量表

初回投与量	減量
80mg/day	休薬
100mg/day	80mg/day→休薬
120mg/day	100mg/day→80mg/day→休薬