

様
ID:


身長 cm 体重 kg

SOX(S1+L-OHP)療法

癌種：大腸癌

(≡ 0.00 m²)

基本レジメン



L-OHP 130mg/m² (day 1) d.i.v.

S-1 1.25m²未満……………80mg/day
1.25m²以上1.5m²未満…100mg/day
1.5m²以上……………120mg/day

1日2回(朝・夕)食後 2weeks p.o.

投与レジメン % dose

| | | 実投与量 | 投与速度 | day 1 | … | day 15 | … | day 21 |
|----|--|------------------|-----------|-------|---|--------|---|--------|
| 内服 | S-1 (80 mg/m ² , 最大120mg/body) | mg | p.o. | 夕 ● | ● | 朝 ● | | |
| 注射 | ① テキサート 6.6 mg + グラニセトロンバッグ 100 mL | 6.6 mg 100 mL | 30min div | ● | | | | 休薬 |
| | ② エルプラット (130 mg/m ²) 5%ブドウ糖液 250 mL | mg 250 mL | 2 hr div | ● | | | | |
| | 5%ブドウ糖液 100 mL プライミング、抜針用 | 100 mL | | ● | | | | |

| | |
|-----------------|--|
| 対象 | 切除不能転移・再発大腸がん PS 0～1 |
| 提出診療科 | 消化器外科 |
| 上記レジメンの根拠となる文献等 | Yamada Y, et.al: Br J Cancer 2008;98:1034-8 D.Y.Zang, et.al: Annals of Oncology 2009;20:892-6 Hong YS, et al.: Lancet Oncol. 13(11): 1125-1132, 2012 |

S-1減量表

| 初回投与量 | 減量 |
|-----------|-----------------------|
| 80mg/day | 休薬 |
| 100mg/day | 80mg/day→休薬 |
| 120mg/day | 100mg/day→80mg/day→休薬 |