

様
ID:
身長 cm 体重 kg

SP療法 (5週レジメン)

癌種: 治癒切除不能進行・再発胃がん

(≒ 0.00 m²)

基本レジメン



投与レジメン

% dose

※TS-1の投与量はBSAの100%doseで算出されます。減量される場合は下表でランクを下げて下さい。

		実投与量		投与速度		day 1	...	8	9	10	...	21	...	day 35
内服	S-1		mg/回	1日2回 p.o.	朝夕	●	●	●	●	●	●	●		
	イメンド			chemo 1.5~1hr前	朝			125mg						
注射	① 生食	500 mL	500 mL	2 hr div				●						休薬
	硫酸Mg補正液	4 mL	4 mL											
	② 生食	500 mL	500 mL	2 hr div				●						
	硫酸Mg補正液	4 mL	4 mL											
	③ テキサート	9.9 mg	9.9 mg	30min div					●					
	+アロキシ	0.75 mg	0.75 mg											
	+生食	100 mL	100 mL											
	④ シスプラチン	60 mg/m ²	mg	2 hr div					●					
	+生食	500 mL	500 mL											
	⑤ マンニトール	200 mL	200 mL	20 min div					●					
⑥ 生食	500 mL	500 mL	2 hr div					●						
⑦ ソルテム3A	500 mL	500 mL	2 hr div					●						
⑧ ソルテム3A	500 mL	500 mL	2 hr div						●	●				
テキサート	6.6 mg	6.6 mg												
⑨ ソルテム3A	500 mL	500 mL	2 hr div						●	●				
⑩ 生食	100 mL	100 mL							●					
		プライミング・後流し用												

対象	治癒切除不能進行・再発胃がん
提出診療科	消化器外科
上記レジメンの根拠となる文献等	Koizumi W,et.al:Lancet Oncology 2008;9:215-21<SPIRITS試験>