


様
ID:
身長 cm 体重 kg

XELOX + Bev 療法 癌種: 切除不能進行/再発 大腸がん
(≡ 0.00 m²)

基本レジメン



Bev 7.5mg/kg (day 1) d.i.v.
L-OHP 130mg/m² (day 1) d.i.v.
cape 1.36m²未満.....1200mg/回
1.36m²以上1.66m²未満..1500mg/回
1.66m²以上1.96m²未満..1800mg/回
1.96m²以上.....2100mg/回 } 1日2回 (朝・夕) 食後
※capeの投与量は添付文書に従って一回内服量で表記しています。

投与レジメン % dose

			実投与量	投与速度	day 1	2	...	14	day15	...	day 21
内服	セロータ		mg/回	1日2回 p.o.	朝	●	●	●	●		
					夕	●	●	●			
注射	① テキサート	6.6 mg	6.6 mg	30min div	●						休業
	+グラニセトロンバッグ	100 mL	100 mL		●						
	② アバスチン	7.5 mg/kg	mg	90min div★	●						
	+生食	100 mL	100 mL		●						
③ エルプラット	130 mg/m ²	mg	2 hr div	●							
5% 糖液	250 mL	250 mL		●							
	5% 糖液	100 mL	100 mL	プライミング・抜針用	●						

★: 初回投与時は90分、初回の忍容性が良好であれば、2回目の投与は60分間、さらに2回目の投与においても忍容性が良好であればそれ以降の投与は30分間投与とすることができる。

対象	切除不能進行・再発 結腸・直腸がん(PS≤1)
提出診療科	消化器外科
提出年月日	2010.05.19.
上記レジメンの根拠となる文献等	Cassidy et al.J Clin Oncol 26 (12);2006-2012,2008 <NO16966試験>