


様
ID:

身長 cm 体重 kg

XELOX + Pmab 療法 癌種：切除不能進行/再発 大腸がん

(≐ 0.00 m²)

基本レジメン



P-mab 6mg/kg (day 1) d.i.v.

L-OHP 130mg/m² (day 1) d.i.v.

cape 1.36m²未満……………1200mg/回
 1.36m²以上1.66m²未満…1500mg/回
 1.66m²以上1.96m²未満…1800mg/回
 1.96m²以上……………2100mg/回

1日2回
(朝・夕)食後

※capeの投与量は添付文書に従って一回内服量で表記しています。

投与レジメン % dose

		実投与量	投与速度	day 1	2	…	14	day 15	…	day 21
内服	セローダ [®]	mg/回	1日2回 p.o.	朝	●	●	●	●		
				夕	●	●	●	●		
注射	① デキサート + グラニセトロンバッグ	6.6 mg 100 mL	30min div	●						休薬
	② ヘクティバックス + 生食 total	6 mg/kg 100 mL	60min div	●						
	③ エルプラット 5% 糖液	130 mg/m ² 250 mL	2 hr div	●						
	5% 糖液	100 mL (プライミング・抜針用)	100 mL	●						

対象	切除不能進行・再発 結腸・直腸がん(PS≤2)
提出診療科	消化器外科
提出年月日	2013.11.19
上記レジメンの根拠となる文献等	Francesco L. et al.Cancer October 1,2013 3429-3435 <MetaPan Study>