


様  
ID:   
身長  cm 体重  kg

XELOX 療法

大腸がん

(≡ 0.00 m<sup>2</sup>)

基本レジメン



L-OHP 130mg/m<sup>2</sup> (day1) d.i.v.  
capecitabine 1.36m<sup>2</sup>未満……………1200mg/回  
1.36m<sup>2</sup>以上1.66m<sup>2</sup>未満…1500mg/回  
1.66m<sup>2</sup>以上1.96m<sup>2</sup>未満…1800mg/回  
1.96m<sup>2</sup>以上……………2100mg/回  
1日2回 (朝・夕)食後  
※capecitabineの投与量は添付文書に従って一回内服量で表記しています。

投与レジメン  % dose

		実投与量	投与速度	day 1	2	…	14	day15	…	day 21
内服	セロータ <sup>®</sup>	mg/回	1日2回 p.o.	朝 夕	● ●	● ●	● ●	● /	休薬	
注射	① デキサート +グラネセトロンバッグ	6.6 mg 100 mL	30min div	●						
	② エルプラット 5% 糖液	130 mg/m <sup>2</sup> 250 mL	2 hr div	●						
	③ 5% 糖液	100 mL	プライミング・抜針用	●						

対象	結腸・直腸がん(PS≤1)
提出診療科	消化器外科
提出年月日	2010.05.19.
上記レジメンの根拠となる文献等	切除不能・再発: Cassidy et al.J Clin Oncol 26 (12);2006-2012,2008 <NO16966試験> Adj: Heller DG,et al:Capecitabine plus oxaliplatin compared with fluorouracil and folinic acid as adjuvant therapy for stage III colon cancer . J Clin Oncol.2011;29:1465-71