

様
ID:


XP 療法

癌種：治癒切除不能進行・再発胃がん

身長 cm 体重 kg

(≒ 0.00 m²)

基本レジメン



投与レジメン

% dose

※セローダの投与量はBSAの100%doseで算出されます。減量される場合は上記でランクを下げて下さい。

		実投与量	投与速度	day 1	2	3	4	…	14	day15	…	day 21
内服	セローダ	mg/回	1日2回 p.o.	朝 夕	●	●	●	●	●	●	●	●
	イメンド		chemo 1.5~1hr前	125mg								
	デカロン		分2(朝・昼)食後		80mg	80mg						
注射	① ソルテム3A	500 mL	500 mL	2 hr div	●							
	② ソルテム3A	500 mL	500 mL	2 hr div	●							
	④ デキサート +アロキシ +生食	9.9 mg 0.75 mg 100 mL	9.9 mg 0.75 mg 100 mL	30min div	●							
	⑤ シスプラチン +生食	80 mg/m ² 500 mL	mg 500 mL	2 hr div	●							
	⑥ ラクテック	500 mL	500 mL	2 hr div	●							
	⑦ ソルテム3A +ラシックス	500 mL 10 mg	500 mL 10 mg	2 hr div	●							
	⑧ 生食	100 mL	100 mL	プライミング・後流し用	●							
	休薬											

対象	治癒切除不能な進行・再発胃がん
提出診療科	消化器外科
上記レジメンの根拠となる文献等	Kang YK, et al.: Ann Oncol. 20(4): 666-673, 2009 Bang YJ, et al.: Lancet 376:687-697,2010 <TOGA試験> Ohtsu A,Shah MA, Van Cutsem E, et al.: J Clin Oncol 2011;29:3968-76. <AVAGAST試験> Nishikawa K, et al.: Eur J Cancer. 101: 220-228, 2018