

様
ID:

mFOLFIRINOX(インフューザポンプ使用)

癌種：膵臓がん(切除不能進行・再発)

身長 cm 体重 kg (≒ 0.00 m²)

投与レジメン

2週毎に



% dose

	実投与量	投与速度
① アロキシ0.75mg + テキサト3.3mg + 生食 100 mL	1 V 3 A 100 mL	30 min div
② エルプラット (85 mg/m ²) + 5%糖液 250 mL	mg 250 mL	2 hr div
③ レボホリナート (200 mg/m ²) + 5%糖液 250 mL	mg 250 mL	2 hr div
④ イリリネカン「タイホウ」 (150 mg/m ²) + 5%糖液 250 mL	mg 250 mL	90 min div
⑤ 5-FU (2400 mg/m ²) + 生食 mL	mg mL	46hr div (インフューザーポンプ)
⑥ 生食 100 mL	100 mL	ライン洗浄・抜針用

本療法は**高度催吐リスクレジメン**です。
悪心・嘔吐を予防するため、
左記の注射薬に**加えて**、以下をご処方ください。
day 1: アプレピタント 125mg 1C
day 2, 3: アプレピタント 80mg 1C

提出診療科 対象	消化器外科 切除不能進行・再発膵臓がん stage IV
提出年月日	2018/9/15
上記レジメンの 根拠となる文 献等	Okusaka T, et al : Cancer Chemother Phaemacol 81 : 1017-1023, 2018