

様  
ID:

mFOLFIRINOX(末梢点滴)

癌種：膵臓がん（切除不能進行・再発）

身長  cm 体重  kg (≒ 0.00 m<sup>2</sup>)

投与レジメン

2週毎に



% dose

本療法は**高度催吐リスクレジメン**です。  
悪心・嘔吐を予防するため、  
左記の注射薬に**加えて**、以下をご処方ください。  
day 1: アプレピタント 125mg 1C  
day 2, 3: アプレピタント 80mg 1C  
day 2, 3, 4, (5): デカドロン錠 8mg

	実投与量	投与速度
① アロキシ0.75mg +テゲサート3.3mg +生食 100 mL	1 V 3 A 100 mL	30 min div
② エルプラット ( 85 mg/m <sup>2</sup> ) +5%糖液 250 mL	mg 250 mL	2 hr div
③ レボホリナート ( 200 mg/m <sup>2</sup> ) +5%糖液 250 mL	mg 250 mL	2 hr div
④ イリリテカン「タイホウ」 ( 150 mg/m <sup>2</sup> ) +5%糖液 250 mL	mg 250 mL	90 min div
⑤ 5-FU ( 2400 mg/m <sup>2</sup> ) +生食 1000 mL	mg 1000 mL	46 hr div
⑦ 生食 100 mL	100 mL	血管外漏出予防のためのライン洗浄用

提出診療科	消化器外科
対象	切除不能進行・再発膵臓がん stage IV
提出年月日	2018/9/15
上記レジメンの根拠となる文献等	Okusaka T, et al : Cancer Chemother Phaemacol 81 : 1017-1023,2018