

様  
ID: [redacted]


様

mFOLFOX 6+Bev

癌種：大腸癌

身長 [redacted] cm 体重 [redacted] kg (≒ 0.00 m<sup>2</sup>)

投与レジメン



[redacted] % dose

	実投与量	投与速度
① グラニセロンパック +デキサート	100 mL 6.6 mg	30min div
② アバスチン +生食	( 5 mg/kg ) 100 mL	1回目 90min div 2回目 60min div 3回目以降 30min div
③ レボホリナート +5%糖液	( 200 mg/m <sup>2</sup> ) 250 mL	2hr div
④ エルプラット +5%糖液	( 85 mg/m <sup>2</sup> ) 250 mL	2hr div
⑤ 5-FU +生食	( 400 mg/m <sup>2</sup> ) 100 mL	全開 div
⑥ 5-FU +生食	( 2400 mg/m <sup>2</sup> ) mL	46hr div (インフューザーポンプ)
⑦ 5%糖液	100 mL	プライミング・抜針用

提出診療科	消化器外科
対象	切除不能進行・再発大腸がん stage IV
提出年月日	2008. 08.01.
上記レジメンの根拠となる文献等	Cassidy et al.J Clin Oncol 26 (12);2006-2012,2008 Yamazaki K,et,al : WJOG4407G (ASCO 2014 # 3534)