


様
ID: [redacted]

mFOLFOX 6

癌種：大腸癌

身長 [redacted] cm 体重 [redacted] kg (≐ 0.00 m²)



[redacted] % dose

	実投与量	投与速度
① グラニセトロンバッグ +デキサート	100 mL 6.6 mg	100 mL 6.6 mg 30min div
② レボホリナート +5%糖液	(200 mg/m ²) 250 mL	mg 250 mL 2hr div
③ エルプラット +5%糖液	(85 mg/m ²) 250 mL	mg 250 mL 2hr div
④ 5-FU +生食	(400 mg/m ²) 100 mL	mg 100 mL 全開 div ②③終了後
⑤ 5-FU +生食	(2400 mg/m ²) mL	mg mL 46hr div (インフューザー ④終了後 ポンプ)
⑥ 5%糖液	100 mL	100 mL プライミング・抜針用

提出診療科	消化器外科
対象	stage III、high risk stage II、切除不能進行・再発大腸がん stage IV
提出年月日	2008. 08.01.
上記レジメンの根拠となる文献等	Tournigand G,et al.J Clin Oncol.22(2):229,2004 Maindrault Goebel F,et.al.Eur J Cancer 35(9):1338,1999 ※両文献ともFOLFOX6オリジナルであり、mFOLFOX6ではない。 Andre T.et al.:J Clin Oncol.27:3109-3116,2009

改訂：2019.08.15