

様

ID:

nab-PAC tri-weekly

癌種：胃がん

身長

cm

体重

kg

(≒)

0.00 m²

※Mosteller の式で算出

投与レジメン



%dose

◆注意！！

ABSOLUTE試験¹⁾においてweekly PTX療法に対するweekly nab-PTX療法の非劣性が証明された(OS: weekly PTX療法10.9カ月vs. weekly nab-PTX療法11.1カ月)。一方、triweekly nab-PTX療法は、weekly PTX療法に対する非劣性を証明できなかったことから、胃癌におけるnab-PTX療法は、より毒性の低いweekly nab-PTX療法が標準投与方法として確立されています。

1) Shitara K, et al.: Lancet Gastroenterol Hepatol. 2(4): 277-287, 2017

アブラキサン[®]の投与量(mg/m²)はpull downで減量段階ごとに選択できます

通常用量: 260mg/m²

1段階減量: 220mg/m²

2段階減量: 180mg/m²

	実投与量	投与速度
① グラニセトロンバッグ	3.00 mg/100mL	3 mg
＋デキサート	6.6 mg	6.6 mg
② 生食	20 mL	20 mL
③ アブラキサン (260 mg/m ²)	mg	30min div
＋生食 適宜	mL	
生食	100 mL	100 mL
		プライミング、抜針用

提出診療科	消化器外科
対象	胃癌 切除不能・再発胃がん 二次治療以降
上記レジメンの根拠となる文献等	Sasaki Y, et al.: Cancer Sci. 105(7): 812-817, 2014 国内第Ⅱ相試験(J-0200試験) アブラキサン点滴静注用100mg 胃癌/肺癌に関する 医薬品医療機器総合機構審査報告書 アブラキサン点滴静注用100mg 適正使用ガイド 胃がん