


様 weekly PTX+Ram 癌種：胃がん
 ID:
 身長 cm 体重 kg (≒ 0.00 m²)

投与レジメン



%dose

		実投与量	投与速度	1	8	15
①	デキサート	6.6 mg				
	+ラニチン塩酸塩注	50 mg	15 min div	●	●	●
	+ホ°ラミン注	5 mg				
②	+生食	100 mL				
	サイラムザ (8 mg/kg)	mg	60 min div	●		●
③	+生食	250 mL				
	生食 (1~2コース目)※	100 mL	60 min div	●	●	●
	(3コース目以降)	50 mL	5 min div		15分	
④	タキソール (80 mg/m ²)	mg	60 min div	●	●	●
	+生食	250 mL				
⑤	生食	100 mL	プライミング・後流し用	●	●	●

※ 最初の2コースは過敏反応発現の有無を確認するため1時間で生食100mL の投与を行う。

提出診療科	消化器外科
対象	胃癌 (切除不能進行・再発)
提出年月日	2018/1/10
上記レジメンの根拠となる文献等	Wilke H,et al : Ramucirumab plus paclitaxel versus placebo plus paclitaxel in patients with previously treated advanced gastric or gastro-oesophageal junction adenocarcinoma (RAINBOW): a double-blind, randomised phase 3 trial. Lancet Oncol. 2014 Oct;15(11):1224-35