

膵臓がんレジメン

GS (術前)療法	<p>GEM 1000mg/m² day 1、8 S-1 80mg ~120mg ※ /day 分2 (朝・夕) 食後 day1夕 ~day15 朝 /q3ws 2コース ※体表面積ごとの投与量 1.25m²未満：80mg/day(40-40mg)、1.25~1.5m²未満：100mg /day(50-50mg)、1.5m²以上：120mg/day (60-60mg) ※術後はS-1単剤療法を1年間</p>
S-1 単剤療法	<p>S-1 80mg ~ 120mg ※/day 分2 (朝・夕) 食後 day1~day28 / q6ws ※体表面積ごとの投与量 1.25m²未満：80mg/day(40-40mg)、1.25~1.5m²未満：100mg /day(50-50mg)、1.5m²以上：120mg/day(60-60mg) ※術後補助化学療法：4コース ※切除不能進行・再発：PDまで</p>
GEM単剤療法	<p>GEM 1000mg/m² day 1、8、15 /q4ws ※術後補助療法：6ヶ月 ※切除不能進行・再発：PDまで</p>
GEM + nab-PTX療法	<p>nab-PTX 125mg/m²、GEM 1000mg/m² day 1、8、15 /q4ws PDまで</p>
FOLFIRINOX	<p>L-OHP 85mg/m²、I-LV 200mg/m²、CPT-11 180mg/m²、5-FU 400mg/m²(bolus)、5-FU 2400mg/m² (46hr持続投与) day1 q2ws PDまで</p>
mFOLFIRINOX	<p>L-OHP 85mg/m²、I-LV 200mg/m²、CPT-11 150mg/m²、5-FU 2400mg/m² (46hr持続投与) day1 q2ws PDまで</p>
GS (切除不能進行再発)療法	<p>GEM 1000mg/m² day 1、8 S-1 60mg ~100mg ※ /day 分2 (朝・夕) 食後 day1夕 ~day15 朝 /q3ws PDまで ※体表面積ごとの投与量 1.25m²未満：60mg/day(40-20mg)、1.25~1.5m²未満：80mg /day(40-40mg)、1.5m²以上：100mg/day (50-50mg) 但し、前コースで安全性・忍容性に問題がない場合はS1のみを1段階増量可能 (60mg/day → 80mg/day、80mg/day → 100mg/day、100mg/day → 120mg/day) ※コース途中で増量は行わない</p>